

Inseticida para controlo de afídeos, moscas brancas e tripses em pepino, pimenteiro, tomateiro, crisântemo, pelargónio e roseira

Concentrado para emulsão (EC) contendo 18,61 g/L ou 2% (p/p) de piretrinas

Autorização de venda n.º 1220, concedida pela DGAV

### MODO DE AÇÃO

**CORDIAL®** é um inseticida biológico de amplo espectro de ação, baseado num extrato de flores dessecadas de *Chrysanthemum cinerariaefolium* cujos ácidos, crisantémico e pirétrico, formam a cinerina, a piretrina e a jasmolina.

**CORDIAL®** possui rápida ação, atuando por contacto nos canais de sódio do sistema nervoso dos insetos. Adicionalmente possui efeito repelente sobre os insetos.

### UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Inimigo	Condições de aplicação	Concentração
Pepino, Pimenteiro, Tomateiro (estufa)	Afídeos: <i>Aphis gossypii</i>	Aplicar o produto no início da infestação. Não exceder a dose máxima de 1.25L/ha N.º máximo de aplicações: 3 (7 dias de intervalo entre aplicações) Intervalo de segurança: 1 dia	160 mL/hL
	Mosca branca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>		
	Tripses: <i>Frankliniella occidentali</i> , <i>Thrips tabaci</i>		
Crisântemo, Roseira, Sardinheira (estufa)	Afídeos: <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>	Aplicar o produto no início da infestação. Não exceder a dose máxima de 1.6L/ha N.º máximo de aplicações: 3 (7 dias de intervalo entre aplicações)	125 - 160 mL/hL
	Mosca branca: <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>		
	Tripses: <i>Thrips tabaci</i>		

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Efetuar a aplicação de manhã cedo ou ao final da tarde.

### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volumes de calda a utilizar: 600 - 1200 L/ha para pepino, pimenteiro e tomateiro e 600 - 1000 L/ha para crisântemo, roseira e sardineira.

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



#### ATENÇÃO

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P262 - Não pode entrar em contato com os olhos, a pele ou a roupa.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.

P391 - Recolher o produto derramado.

P405 - Armazenar em local fechado à chave.

P501a Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208 Contém formaldeído. Pode provocar uma reação alérgica.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe8: Perigoso para abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.

SPo5: Arejar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas entrar.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 800 250 250**

### Armazenagem do produto

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ESTE PRODUTO PODE SER USADO EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO

#### Titular da autorização de venda:

COPYR S.p.A.  
Via G. Stephenson, 29  
20157 Milão  
Itália

#### Distribuído por:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
C/ Vildomat 321, 5º, 08029 Barcelona (Espanha)  
Tel: +34 93 495 25 00 –  
[www.massoagro.com](http://www.massoagro.com)