SUMIFIVE® PLUS

FICHA TÉCNICA

Inseticida piretróide que controla afídeos, psilas, lagartas e o percevejo e escaravelho da batata

Emulsão óleo em água (EW) contendo 50 g/L ou 4,85% (p/p) de esfenvalerato

Autorização de venda n.º 0190, concedida pela DGAV

MODO DE AÇÃO

O **SUMIFIVE® PLUS** é um inseticida, atua por contacto e ingestão. O esfenvalerato é um piretróide e atua no sistema nervoso, como modulador dos canais de sódio.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar ao aparecimento das primeiras formas móveis:

CULTURA	PRAGA	DOSE/ CONCENTRAÇÃO	INTERVALO DE SEGURANÇA (dias)
Trigo, Triticale, Cevada, Centeio e Aveia	Afídeos *(Rhopalosiphum padi; Sitobion avenae; Schizaphis graminum).*	0,2-0,3L/ha	28
Algodão	Afídeos (*Aphis gossypii; Pectinophora sp.; Earia insulana);* Lagartas *(Helicoverpa armigera).*	0,4-0,6L/ha	28
Macieiras e Pereiras	Afídeos *(Eriosoma lanigerum; Dysaphis plantaginea; Aphis pomi; Myzus persicae)*	20-30 mL/hL	14
Pereiras	Psila da pereira *(Cacopsylla pyri)*		
Tomateiro	Afídeos (*Myzus persicae; Macrosiphum euphorbiae).* Lagartas *(Autographa gamma; Spodoptera littoralis; Helicoverpa armigera).*	0,2-0,3 L/ha	3
Craveiro	Lagartas (*Tortrix pronubana*)		-
Roseira	Afídeos (*Aphis gossypii; Myzus persicae; Macrosiphum rosae).* Lagartas *(Helicoverpa armigera).*		-
Colza	Lagartas *(Helicoverpa armigera).*		42
Beterraba sacarina	Afídeos (*Aphis fabae).* Lagartas *(Autographa gamma; Chrysodeixis chalcites; Helicoverpa armigera).*		-
Videira	Traça-da-uva (*Lobesia botrana*).		14

Estrada do Seixalinho |City Park | Arm. A |
2870 – 339 Montijo
212 326 797

FITOSISTEMA
GROWING WITH FUTURE

CULTURA	PRAGA	DOSE/ CONCENTRAÇÃO	INTERVALO DE SEGURANÇA (dias)
Batateira	Afídeos (*Aphis fabae; Myzus persicae).* Lagartas *(Autographa gamma; Spodoptera littoralis; Helicoverpa armigera).* *Escaravelho da batateira (Leptinotarsa decemlineata).* Percevejo (*Nezara viridula*).		7

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências recomenda-se a alternância deste produto com inseticidas com diferentes modos de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volumes de calda a utilizar: 300 - 500 L/ha para trigo, triticale, cevada, centeio, colza e aveia; 300 - 600 L/ha para algodão e beterraba sacarina; 600 - 1000 L/ha para macieira e pereira; 500 - 1000 L/ha para tomateiro; 1000 L/ha para craveiro e roseira; 300 - 1000 L/ha para videira; 300 - 800 L/ha para batateira.

SUMIFIVE® PLUS

FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

H302 Nocivo por ingestão
H332+313 Nocivo em contacto com a pele ou por inalação.
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P391 - Recolher o produto derramado.
P501a Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
SPe3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 15 metros em hortícolas, algodão, trigo, triticale, aveia, centeio, cevada e ornamentais; 20 metros em vinha e 30 metros em pomares de macieira e pereira.
SPoPT2 – Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
SPoPT4 – O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção durante a preparação da calda e aplicação do produto.
SPoPT5 – Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 – Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 800 250 250

Armazenagem do produto

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Estrada do Seixalinho |City Park | Arm. A |
2870 – 339 Montijo
212 326 797

FITOSISTEMA
GROWING WITH FUTURE

SUMIFIVE® PLUS

FICHA TÉCNICA

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da autorização de venda:
KENOGARD, S.A.
Poeta Joan Maragall, 51, 3º, Of. 3 –
28020 Madrid – Espanha
Telef.: +34 911594900